

Characterization of a population of 222 patients with burning mouth syndrome

Autores: Henriques I (a), Cardoso I (b), Pinto AC (b), Trancoso P (b), Azul (b)

Instituição: a) Universidad Santiago de Compostela b) Clinica Integrada de Medicina Oral

Valor da bolsa: 200.00€

Apresentação durante o evento 13th BIENNIAL EAOM CONGRESS 2016 em Turim, Itália | 2016-09-15

Resumo:

O Síndrome de boca ardente (SBA) caracteriza-se por sensação de ardor/queimadura na mucosa oral, sem fator etiológico local ou sistémico demonstrável, com um impacto negativo na vida dos doentes, com prevalência descrita entre 0,7-12,2%.

O objetivo deste estudo é caracterizar uma população com SBA numa consulta de Medicina oral em Portugal comparando com a bibliografia.

Estudo retrospectivo, observacional, transversal e comparativo. Foram analisadas 9595 fichas clínicas caracterizando-se os doentes por idade, género, atraso no diagnóstico, especialidades consultadas, sintomatologia e localização, entre outros. Foi efetuada a análise estatística descritiva e inferencial (teste do qui-quadrado, nível de significância 5%).

Identificaram-se 312 doentes com SBA (fem=85% e masc=15%) (?)